Влияние биопрепарата «Фитоп 27.83» на питательную и энергетическую ценность злаково-бобовых смесей

Александр Александрович Пузик, Александр Николаевич Никитин
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», Тверь, Россия
n1779@yandex.ru

Аннотация. Представлен экспериментальный материал по изменению качества злаково-бобового силоса при введении в него биопрепарата «Фитоп 27.83». Показано влияние, оказываемое силосами, заготовленными на его основе, на продуктивность дойного стада крупного рогатого скота. Установлено изменение содержания питательных веществ при применении данного биоконплекса.

Ключевые слова: биопрепарат; злаково-бобовая смесь; питательные вещества; продуктивность; крупный рогатый скот.

Для цитирования: Пузик А. А., Никитин А. Н. Влияние биопрепарата «Фитоп 27.83» на питательную и энергетическую ценность злаково-бобовых смесей // Аграрный научный журнал. 2021. № 11. С. 79–83. <http://dx.doi.org/10.28983/asj.y2021i11pp79-83>.

VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNICS

Original article

The influence of the biological product “Fitop 27.83” on the nutritional and energy value of cereal-legume mixtures

Aleksandr A. Puzik, Aleksandr N. Nikitin
Federal Scientific Center of Bast Crops, Tver, Russia
n1779@yandex.ru

Abstract. Experimental material on the change in the quality of cereal-legume silage with the introduction of the biological product “Fitop 27.83” is presented. The effect of silos harvested on its basis on the productivity of a dairy herd of cattle is shown. A change in the content of nutrients was established when using this biocomplex.

Keywords: biological product; cereal and legume mixture; nutrients; productivity; cattle.

For citation: Puzik A. A., Nikitin A. N. The influence of the biological product “Fitop 27.83” on the nutritional and energy value of cereal-legume mixtures. Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal. 2021;(11):79–83. (In Russ.). <http://dx.doi.org/10.28983/asj.y2021i11pp79-83>.

Введение. При производстве продуктов питания и кормов особое место занимает проблема белка. Огромное значение в ее решении отводится бобовым культурам, так как они обеспечивают значительный выход высококачественного белка с гектара посева. Кроме того, оставляя в почве большое количество азота за счет азотфиксирующей деятельности живущих на их корнях бактерий, позволяют больше создавать белка, посеянными после них культурами [1].

Для обеспечения высокой продуктивности молочного стада животным необходимы сочные корма [20]. Однако они подвержены неблагоприятному воздействию технологических факторов уборки и хранения. При заготовке кормов впрок методом силосования важно максимально сохранить кормовые достоинства исходного сырья, поэтому широкое применение получило использование консервантов.

Установлено, что силосование зеленых кормов с применением консервантов позволяет снизить потери органических веществ от 3 до 5 раз. Также за счет использования консервантов в каждой тонне силосованной массы можно дополнительно получить от 3 до 8 кг перевариваемого протеина, от 10 до 15 кг сахара, от 15 до 25 г каротина. Следует отметить, что 1 т химических консервантов сохраняет в силосе такое количество питательных и биологически активных веществ, которое позволяет дополнительно получить в среднем около 10 т молока или 1,5 т мяса [2–4]. Поэтому в связи с вышеизложенным одна из актуальных задач – определение эффективности применения новых биологических препаратов, способных при силосовании зеленой массы максимально сохранять ценные свойства исходного сырья для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных.

Цель данной работы – изучение влияния биопрепарата «Фитоп 27.83» на питательную и энергетическую ценность злаково-бобовых смесей, которые при их скармливании способствуют повышению продуктивности сельскохозяйственных животных; разработка наставлений по элементам технологии возделывания злаково-бобовых смесей.

Методика исследований. Лабораторные исследования выполняли на базе аналитической лаборатории отдела животноводства по ГОСТам [5–16], утвержденным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Для этого использовали ионметр лабораторный И-160 МИ, фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», анализатор пламенно-фотометрический универсальный ФПА-01, весы лабораторные электронные LEKI B5002, весы лабораторные электронные LEKI B2104, зарегистрированные в Государственном реестре средств измерений и допущенные к использованию на территории Российской Федерации; вспомогательное оборудование, аттестованное в ФБУ «Смоленский ЦСМ».

Схема опыта. Была засилосована зеленая масса четырех видов травосмесей – смесь овса (Скакун) с горохом посевным (Джекпот), кормовыми бобами (Янтарный), люпином желтый (Бригантина) и викой яровой (Кшень) (50 % + 50 % от рекомендуемой нормы высева в чистом виде) в двух вариантах: контроль (без препарата), с препара-

том «Фитоп 27.83». В его состав входили хорошо зарекомендовавшие себя штаммы *Propionobacterium freudenreichii*, *Pediococcus pentosaceus*, *Lactococcus lactis*, *Lactobacillus plantarum*, а также *Bacillus licheniformis* и *B. subtilis*. В 1 мл биоконсерванта «Фитоп 27.83» содержится не менее 1×10^{11} КОЕ (колониеобразующих единиц), то есть его концентрация на 1 г обрабатываемой растительной массы составляет 100 тыс. или 10^5 бактерий.

Предшественником были яровые зерновые. Почва дерново-подзолистая легкосуглинистая. Фон минерального питания (РК)₆₀.

Потенциальный среднесуточный удой молока коров рассчитывали с помощью компьютерной программы «Корралл – Кормление молочного скота» и АРМ «Рационы» (версия 3.4 МР). Энергетическую питательность кормов устанавливали по методике расчета обменной энергии в кормах на основе содержания сырых питательных веществ [17]. Для статистической обработки данных использовали корреляционный и регрессионный анализ по Б.А. Доспехову [18].

Органолептическая оценка образцов силоса исследуемых вариантов соответствовала требованиям ГОСТ Р 55986-2014 [6]. При этом обращали внимание на такие признаки, как отсутствие плесени, характерного запаха квашеных овощей, немажущаяся консистенция.

Результаты исследований. Обработка зеленой массы при приготовлении силоса препаратом «Фитоп 27.83» положительно сказалась на следующих показателях качества: сырая клетчатка, сырая зола и т.д., что в свою очередь сказалось на увеличении энергоемкости корма (табл. 1).

Наибольшее содержание сырого протеина было отмечено в вариантах силоса, приготовленного из овса с люпином желтым (*Lupinus luteus* L.) – 14,31 % и кормовыми бобами (*Vicia faba* L.) – 13,17 % в сухом веществе (табл. 2).

Таблица 1

Качественные показатели силоса, заготовленного с использованием препарата «Фитоп 27.83», %

Фактор А (силос)	Фактор Б (биопрепарат)		Средние по фактору А
	контроль	«Фитоп 27.83»	
Содержание сухого вещества			
Овес + люпин	26,71	20,82	23,77
Овес + вика	27,33	21,21	24,27
Овес + бобы	28,43	22,05	25,24
Овес + горох	30,53	23,66	27,10
Средние по фактору Б	28,25	21,94	–
Содержание уксусной кислоты			
Овес + люпин	0,26	0,19	0,23
Овес + вика	0,82	0,47	0,65
Овес + бобы	0,78	0,42	0,60
Овес + горох	1,82	1,15	1,48
Средние по фактору Б	0,92	0,56	–
Содержание масляной кислоты			
Овес + люпин	0,13	0,10	0,11
Овес + вика	0,15	0,13	0,14
Овес + бобы	0,19	0,20	0,19
Овес + горох	0,05	0,05	0,05
Средние по фактору Б	0,13	0,12	–
Содержание молочной кислоты			
Овес + люпин	1,83	1,95	1,89
Овес + вика	1,68	1,72	1,70
Овес + бобы	1,25	1,29	1,27
Овес + горох	0,37	0,41	0,39
Средние по фактору Б	1,28	1,34	–
Содержание сырой клетчатки в сухом веществе			
Овес + люпин	31,54	37,87	34,70
Овес + вика	32,93	40,60	36,76
Овес + бобы	32,73	38,40	35,56
Овес + горох	34,63	39,82	37,23
Средние по фактору Б	32,96	39,17	–
Содержание сырой золы в сухом веществе			
Овес + люпин	6,73	7,77	7,25
Овес + вика	6,60	7,58	7,09
Овес + бобы	7,04	8,04	7,54
Овес + горох	7,00	8,12	7,56
Средние по фактору Б	6,84	7,87	–
Содержание кальция в сухом веществе			
Овес + люпин	0,85	0,92	0,89
Овес + вика	0,81	0,86	0,84
Овес + бобы	0,85	0,87	0,86
Овес + горох	0,75	0,82	0,78
Средние по фактору Б	0,82	0,87	–

Таблица 2

Влияние исследуемых факторов на содержание сырого протеина в сухом веществе силоса, %

Фактор А (силос)	Фактор Б (биопрепарат)		Средние по фактору А
	контроль	«Фитоп 27.83»	
Овес + люпин	14,31	15,61	14,96
Овес + вика	12,92	14,29	13,61
Овес + бобы	13,17	15,04	14,11
Овес + горох	12,23	13,39	12,81
Средние по фактору Б	13,16	14,58	—
НСР ₀₅ частных различий	0,57		
НСР ₀₅ по фактору А	0,36		
НСР ₀₅ по фактору Б	0,29

Обработка растительного материала «Фитоп 27.83» достоверно сказалась на содержании сырого протеина силоса в сторону его увеличения от 1,17 % в варианте овес + горох до 1,87 % в варианте овес + бобы.

Содержание обменной энергии в сухом веществе силоса изученных вариантов представлено в табл. 3. В целом содержание энергии зависело от вида силоса и варьировало от 8,75 МДж/кг (овес + горох) до 9,78 МДж/кг (овес + люпин).

Для оценки эффективности применения в заготовке кормов препарата «Фитоп 27.83» был рассчитан потенциальный удой, обеспечиваемый рационом, включающим в себя изучаемые варианты силоса [19]. За основу был взят рацион для дойной коровы бурой швицкой породы в возрасте 4 года живой массой 550 кг, средней упитанности, содержащейся в условиях привязной системы; в стадии стабилизации лактации. Рацион характерен для среднестатистического хозяйства Смоленской области, с типичным для данного региона уровнем кормления. Данный рацион обеспечивал фактический среднесуточный удой 16 кг молока жирностью 3,8 % (табл. 4).

Энергетическая и питательная ценность кормов, входящих в данный рацион, приведена в табл. 5. Замена силоса, заготовленного в хозяйстве, на силос, изучаемый в данном опыте, положительно сказалась на продуктивности животных.

Эффект взаимодействия силоса и биопрепарата показан на рисунке. Так, использование «Фитоп 27.83» при заготовке силоса может потенциально способствовать получению дополнительно от 0,4 до 0,7 кг молока по сравнению с удоем, полученным при использовании силоса, заготовленного без данного биопрепарата. Наиболее существенно на потенциальный удой способно повлиять сочетание овес + люпин с препаратом «Фитоп 27.83», которое позволяет только за счет применения биопрепарата получить 0,7 кг молока дополнительно к удою. Наименьшее увеличение потенциального удоя показало сочетание овес + вика с «Фитоп 27.83», ожидаемая прибавка составила только 0,4 кг молока. В табл. 6 приведены данные экономического эффекта от применения «Фитоп 27.83» при заготовке силоса злаково-бобовых смесей.

Заключение. По результатам исследований установлено, что использование силоса, полученного из бобово-злаковой смеси, в системе кормопроизводства и кормления сельскохозяйственных животных в регионе является оправданным приемом. Корм отличается более высоким содержанием протеина в сухом веществе. По органолептической оценке образцы силоса исследуемых вариантов соответствовали требованиям ГОСТ Р 55986-2014. Обработка зеленой массы препаратом «Фитоп 27.83» при приготовлении силоса положительно сказалась на таких показателях качества, как сырой протеин, сырая клетчатка, сырая зола, что в свою очередь сказалось на увеличении энергоемкости корма.

Обработка бобово-злаковой смеси препаратом «Фитоп 27.83» достоверно сказалась на содержании сырого протеина в силосе в сторону его увеличения.

Использование биопрепарата «Фитоп 27.83» при обработке заготовленной зеленой массы травосмесей во время приготовления силоса положительно повлияло на сохранение энергоемкости корма. В опытных образцах силоса содержание обменной энергии в среднем было на 0,65 МДж выше по сравнению с контролем.

Использование «Фитоп 27.83» при заготовке силоса может потенциально способствовать получению дополнительно от 0,7 до 0,9 кг молока по сравнению с удоем, полученным при использовании силоса, заготовленного без

Таблица 3

Содержание обменной энергии в сухом веществе силоса в зависимости от исследуемых факторов, МДж/кг

Фактор А (силос)	Фактор Б (биопрепарат)		Средние по фактору А
	контроль	«Фитоп 27.83»	
Овес + люпин	9,18	9,78	9,48
Овес + вика	8,97	9,54	9,26
Овес + бобы	8,92	9,75	9,34
Овес + горох	8,75	9,37	9,06
Средние по фактору Б	8,96	9,61	—
НСР ₀₅ частных различий	0,24		
НСР ₀₅ по фактору А	0,15		
НСР ₀₅ по фактору Б	0,12		

Таблица 4

Рацион дойного стада в стойловый период (октябрь)

Наименование корма	Суточная дача, кг
Силос	28
Сено	6
Дерть зерновая	6
Соль поваренная	0,09

Таблица 5

Питательная и энергетическая ценность кормов для составления рационов дойному стаду в стадии стабилизации лактации

Зоотехнический показатель, г/кг корма при натуральной влажности	Силос разнотравный	Сено злаковое	Дерть зерновая
Обменная энергия, МДж/кг	1,78	6,3	10,7
Сухое вещество	250	830	875
Сырой протеин	33	84	100,6
Сырой жир	13	26	54,7
Сырая клетчатка	86	234	55,1
Сырая зола	18,7	44,7	34,1
Безазотистые экстрактивные вещества	98	411	630,5
Крахмал	2	12	320,3
Сахар	3	35	25,4
Кальций	2,1	6,9	1,5
Фосфор	0,6	1,7	3,4

Изменение потенциального среднесуточного удоя при введении в рацион силосов с применением препарата «Фитоп 27.83», кг

Таблица 6

Экономический эффект от применения препарата «Фитоп 27.83» при заготовке силоса злаково-бобовых смесей, руб. на 1 гол. в сутки

Фактор А (силос)	Фактор Б (биопрепарат)		Прибавка+/-
	контроль	«Фитоп 27.83»	
Овес + люпин	437,5	455,0	17,5
Овес + вика	432,5	445,0	12,5
Овес + бобы	435,0	450,0	15,0
Овес + горох	427,5	437,6	10,1

данного биопрепарата. Применение биопрепарата «Фитоп 27.83» увеличит экономическую эффективность производства товарного молока от 10,1 до 17,5 руб. в сутки на одну голову.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Романенко Г. А., Тютюнников А. И. Корма. М.: Россельхозакадемия, 1997. 480 с.
2. Савина Е. А., Прудникова А. Г., Прудников А. Д. Урожайность и кормовые качества суданской травы и ее смесей с зерно-бобовыми культурами // Кормопроизводство. 2016. № 3. С. 12–15.
3. Зубрилин А. А., Коньков С. И. Химические методы консервирования сочных кормов // Проблемы животноводства. 1936. № 2. С. 20–23.
4. Зубрилин А. А. Силосование трав различных видов // Труды ВНИИ кормления сельскохозяйственных животных. 1956. Т. 3. С. 246–259.
5. ГОСТ 31640-2012. Корма. Методы определения содержания сухого вещества. М.: Стандартинформ, 2012. 8 с.
6. ГОСТ Р 55986-2014. Силос из кормовых растений. Общие технические условия. М.: Стандартинформ, 2014. 12 с.
7. ГОСТ 26180-84. Корма. Методы определения аммиачного азота и активной кислотности (рН). М.: Изд-во стандартов, 1984. 6 с.
8. ГОСТ 13496.4-93. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина. Минск, 1995. 15 с.
9. ГОСТ 13496.15-97. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира. М.: Стандартинформ, 2005. 10 с.
10. Практикум по агрохимии / под ред. Б. А. Ягодина. М.: Агропромиздат, 1987. 511 с.
11. ГОСТ 26226-95. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырой золы. М.: Изд-во стандартов, 2003. 6 с.
12. ГОСТ Р 51636-2000. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Фотометрический с применением 2,4-динитрофенола и перманганатный методы определения массовой доли водорастворимых углеводов. М.: Изд-во стандартов, 2000. 15 с.
13. ГОСТ 26657-97. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания фосфора. Минск, 1999. 10 с.
14. ГОСТ 26570-95. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция. М.: Изд-во стандартов, 2003. 14 с.
15. ГОСТ 30503-97. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания натрия. М.: Изд-во стандартов, 2002. 6 с.
16. ГОСТ 30504-97. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания калия. М.: Изд-во стандартов, 2002. 8 с.
17. Методика расчета обменной энергии в кормах на основе содержания сырых питательных веществ / М. П. Кириллов [и др.]. Дубровицы: Изд-во ВНИИ животноводства Россельхозакадемии, 2008. 32 с.
18. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта: с основами статистической обработки результатов исследований. М.: Колос, 1979. 416 с.
19. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие / под ред. А. П. Калашникова [и др.]. М.: Россельхозакадемия, 2003. 456 с.
20. Использование гидропонного зеленого корма для оптимизации зимних рационов крупного рогатого скота / А. А. Васильев [и др.] // Аграрный научный журнал. 2016. № 3. С. 13–16.

REFERENCES

1. Romanenko G. A., Tyutyunnikov A. I. Feed. Moscow; 1997. 480 p. (In Russ.).
2. Savina E. A., Prudnikova A. G., Prudnikov A. D. Productivity and fodder qualities of Sudanese grass and its mixtures with leguminous crops. *Feed production*. 2016; 3: 12–15. (In Russ.).
3. Zubrilin A. A., Konkov S. I. Chemical methods of preserving succulent feed. *Problems of animal husbandry*. 1936; 2: 20-23. (In Russ.).
4. Zubrilin A. A. Silage of grasses of various types. Proceedings of the All-Russian Research Institute of feeding agricultural animals. 1956; 3: 246-259. (In Russ.).
5. GOST 31640-2012. Stern. Methods for determining the dry matter content. Moscow; 2012. 8 p. (In Russ.).
6. GOST R 55986-2014. Silage from forage plants. General technical conditions. Moscow; 2014. 12 p. (In Russ.).
7. GOST 26180-84. Stern. Methods for determination of ammoniacal nitrogen and active acidity (pH). Moscow; 1984. 6 p. (In Russ.).
8. GOST 13496.4-93. Feed, compound feed, compound feed raw materials. Methods for the determination of nitrogen and crude protein content. Minsk; 1995. 15 p. (In Russ.).
9. GOST 13496.15-97. Feed, compound feed, compound feed raw materials. Methods for determination of crude fat content. Moscow; 2005. 10 p. (In Russ.).
10. Workshop on agrochemistry / ed. B. A. Yagodina. Moscow; 1987. 511 p. (In Russ.).
11. GOST 26226-95. Feed, compound feed, compound feed raw materials. Methods for determination of raw ash. Moscow; 2003. 6 p. (In Russ.).
12. GOST R 51636-2000. Feed, compound feed, compound feed raw materials. Photometric using 2,4-dinitrophenol and permanganate methods for determining the mass fraction of water-soluble carbohydrates. Moscow; 2000. 15 p. (In Russ.).
13. GOST 26657-97. Feed, compound feed, compound feed raw materials. Method for determination of phosphorus content. Minsk; 1999. 10 p. (In Russ.).
14. GOST 26570-95. Feed, compound feed, compound feed raw materials. Methods for the determination of calcium. Moscow; 2003. 14 p. (In Russ.).
15. GOST 30503-97. Feed, compound feed, compound feed raw materials. Flame photometric method for the determination of sodium content. Moscow; 2002. 6 p. (In Russ.).
16. GOST 30504-97. Feed, compound feed, compound feed raw materials. Flame-photometric method for determination of potassium content. Moscow; 2002. 8 p. (In Russ.).
17. Methodology for calculating metabolic energy in feed based on the content of raw nutrients / M.P. Kirillov et al. Dubrovitsy; 2008. 32 p. (In Russ.).
18. Dospekhov B. A. Method of field experiment: with the basics of statistical processing of research results. Moscow; 1979. 416 p. (In Russ.).
19. Norms and rations of feeding farm animals: Reference manual / ed. A. P. Kalashnikov et al. Moscow; 2003. 456 p. (In Russ.).
20. The use of hydroponic green forage to optimize winter rations of cattle / A. A. Vasiliev et al. *Agrarian scientific journal*. 2016; 3: 13-16. (In Russ.).

*Статья поступила в редакцию 29.06.2021; одобрена после рецензирования 30.06.2021; принята к публикации 01.07.2021.
The article was submitted 29.06.2021; approved after reviewing 30.06.2021; accepted for publication 01.07.2021.*